



Ikke svelg lakken. Våre merknader og/eller råd fritar deg ikke fra å kontrollere om produktene som leveres av oss, er egnet til det tiltenkte formålet.

**Lagring:** Lagring ved 4–23 °C. Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
**Kassering:** Produktet må avfallsbehandles i henhold til lokale forskrifter.

**Meldeplikt:**
Alvorlige tilfeller som dødsfall, midlertidig eller permanent alvorlig forringelse av helsetil til pasienten, brukeren eller andre personer og en alvorlig folkehelseerisiko som er oppstått eller kunne ha oppstått i forbindelse med bruk av **ORBIS Fluoride Varnish**, må rapporteres til produsent og de ansvarlige myndighetene.

## FL Käyttöohjeet | MD EU Lääkinnällinen laite Fluoripitoisten hampaan vihlintaая vähentävä lakka

**Tuotekuvaus:**
**ORBIS Fluoride Varnish** on fluoripitoitinen hampaan vihlintaая vähentävä lakka, jota käytetään kiille- ja dentiinipintojen käsittelyyn. **ORBIS Fluoride Varnish** kiinnittyy myös kosteille pinnoille sekä sietää kosteuden ja syljen jäämiä.

**ORBIS Fluoride Varnish** on etanolinen suspensio, joka sisältää kolofonia sekä keinoeteista aroamiainetta ja makeutusaineena ksylitolia.

1 ml **ORBIS Fluoride Varnish** sisältää 50 mg natriumfluoridia, mikä vastaa 22,6 mg fluorida.

**Käyttöaiheet:**
**ORBIS Fluoride Varnish** -tuotteen käyttötarkoituksia ovat:
erittäin herkkien hampaiden käsittely herkkien juurenpintojen hoitoon

**Vasta-aiheet:**
**ORBIS Fluoride Varnish** sisältää kolofonia ja keinoeteista aroamiainetta. Jos potilaan tiedetään olevan yliherkkä (allerginen) **ORBIS Fluoride Varnish** -tuotteen aineosille, tuotetta ei saa käyttää.
**ORBIS Fluoride Varnish** -tuotetta ei saa käyttää potilailla, joilla on suussa haavaisia ien- tai limakalvotulehduksia.
**ORBIS Fluoride Varnish** -tuotetta ei ole tarkoitettu systeemiseen hoitoon.

**Potilaskohderyhmä:**
**ORBIS Fluoride Varnish** -tuotetta voidaan käyttää kaikilla potilailla ilman ikään tai sukupuoleen liittyviä rajoituksia.
**Tuotteen suoritusomaisuudet:**
Tuotteen suoritustyky on käyttötarkoituksen edellyttämien vaatimusten ja asianomaisten tuotenormien mukaisia.

**Käyttäjät:**
**ORBIS Fluoride Varnish** -tuotetta käyttävät hammaslääketieteellisen ammattikoulutuksen omaavat käyttäjät.

**Käyttötapa:**
Suosittelua annos:
Toimenpide potilailla, joilla on maitohampaisto noin 0,25 ml **ORBIS Fluoride Varnish** -tuotetta

Toimenpide potilailla, joilla on vaihduntahampaisto tai pysyvä hampaisto noin 0,40 ml **ORBIS Fluoride Varnish** -tuotetta

Levitä ohut kalvo **ORBIS Fluoride Varnish** -tuotetta hampaan kovakudoksen pintaan. Paksu kalvo irtoaa helpommin eikä ole hoidollisesti tehokkaampi. Kokemuksen perusteella koko hampaistoon tarvittava määrä on 0,25–0,40 ml.

**Valmistelu:**
Poista hammaskivi perusteellisesti hoidettavalta pinnalta. Optimaalisen tuloksen takaamiseksi tulisi ylimääräinen neste/syliä poistaa käsiteltävältä pinnalta.

**Applikointi:**
Levitä **ORBIS Fluoride Varnish** -tuotetta tasaisesti niin, että ohut kalvo peittää koko pinnan. **ORBIS Fluoride Varnish** -tuotteen sidostuminen voidaan varmistaa kostuttamalla käyttöalue (joko vähäisellä huuhtelulla tai muodostuvalla syljellä).

**Huomautukset, varoitusmerkitteet:**

Potilailla on ohjeistettava välttämään kiinteää ravintoa, alkoholia, hampaiden pesua ja hammaslaugan käyttöä 4 tunnin ajan toimenpiteen jälkeen.

Kolofoni voi haitata yhdistelmämuovien kovettumista ja sidosta.

Sylinteriampullia käytettäessä on aina käytettävä ainoastaan sille tarkoitettuja tyyppiä applikointikärkkiä (pituus 32 mm, halkaisija 0,9 mm). Sylinteriampullin sisältämää **ORBIS Fluoride Varnish** -tuotetta voidaan käyttää useita kertoja. Poista kärki applikoinnin jälkeen ja säilytä sylinteriampullia ilman kärkeä (ampullin kumiiviviste sulkee ampullin tiiviisti). Aseta sylinteriampulliin uusi kärki ennen seuraavaa applikointikertaa.

Käyttötarkoituksensa mukaisesti **ORBIS Fluoride Varnish** -tuotteen koostumus on tahmea. Putkiiloa käytettäessä kierteeseen jäävät materiaaliäämät voivat johtaa kannen liimautumiseen kiinni. Poista mahdolliset epäpuhtaudet etanolipitoisella liinalla.

**Opslag:**
Opslaan tussen 4°C-23°C. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

**Afvoer:**
Afvoer van het hulpmiddel volgens de lokale officiële voorschriften.
**Meldingsplicht:**
Ernstige incidenten zoals overlijden, tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere personen en een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, die in samenhang met **ORBIS Fluoride Varnish** zijn optreden of hadden kunnen optreden, moeten aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten worden gemeld.

Toimenpidepäivänä ei tule käyttää muita fluoripitoisia valmisteita.

Fluoritablettien ottaminen tulee keskeyttää muutaman päivän ajaksi **ORBIS Fluoride Varnish** -tuotteen käytön jälkeen.

Lakkaa ei saa niellä.

Antamamme tiedot tai neuvot eivät vapauta käyttäjää velvollisuudesta arvioida toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiottoon käyttöön.

**Säilytys:**
Säilytä 4–23 °C:n lämpötilassa. Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
**Hävittäminen:**
Hävitä tuote paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti.

**Ilmoitusvelvollisuus:**
Vakavista vaaratilanteista, kuten kuolema, potilaan, käyttäjän tai muiden henkilöiden terveydentilan ohimenevä tai pysyvä vakava heikkeneminen, ja vakava vaara julkiselle terveydelle, joita ilmenee tai olisi voinut ilmetä **ORBIS Fluoride Varnish** -tuotteen käytössä, on ilmoitettava valmistaja sekä asiasta vastaavalle viranomaiselle.

### NL Gebruiksaanwijzing | MD EU Medisch hulpmiddel Fluoridehoudende lak voor tanddesensibilisering

**Beschrijving van het hulpmiddel:**
**ORBIS Fluoride Varnish** is een fluoridehoudende lak voor tanddesensibilisering bij de behandeling van glazuur- en dentineoppervlakken. **ORBIS Fluoride Varnish** hecht ook aan vochtige oppervlakken en verdraagt resten van vocht en speeksel.

**ORBIS Fluoride Varnish** is een ethanoluspensie van colofonium met een kunstmatig aroma en het zoete effect van xylitol.

1 ml **ORBIS Fluoride Varnish** bevat 50 mg natriumfluoride wat overeenkomt met 22,6 mg fluorida.

**Indicaties:**
**ORBIS Fluoride Varnish** is bedoeld voor:
de behandeling van hypergevoelige tanden
de behandeling van gevoelige worteloppervlakken

**Contra-indicaties:**
**ORBIS Fluoride Varnish** bevat colofonium en kunstmatig aroma. Bij bekende overgevoeligheden (allergieën) tegen bestanddelen van **ORBIS Fluoride Varnish** moet van het gebruik worden afgezien.
**ORBIS Fluoride Varnish** mag niet worden gebruikt bij patiënten met zwerende tandvlees- of mondslimvliesontstekingen.

**ORBIS Fluoride Varnish** is niet bedoeld voor systemische behandeling.

**Patiëntendoelegroep:**
**ORBIS Fluoride Varnish** kan voor alle patiënten zonder beperking ten aanzien van leeftijd of geslacht worden gebruikt.

**Prestatie-eigenschappen van het hulpmiddel:**
Leczoną powierzchnię dokładnie oczyścić z kamienia nazębnego. Najlepsze wyniki zapewnia całkowite usunięcie nadmiaru wilgoci/sliny z leczonych powierzchni.

**Gebruiker:**
**ORBIS Fluoride Varnish** wordt toegepast door professioneel in de tandheelkunde opgeleide gebruikers.

**Gebruik:**
Aanbevolen dosis:
Behandeling van patiënten met een melkgbit ca. 0,25 ml **ORBIS Fluoride Varnish**
Behandeling van patiënten met een wisselgebit of blijvend gebit ca. 0,40 ml **ORBIS Fluoride Varnish**

Breng een dun laagje **ORBIS Fluoride Varnish** aan op de harde tandsubstantie. Een dikke laag laat makkelijker los en biedt geen therapeutische voordelen. Het is de ervaring dat de benodigde hoeveelheid voor een heel gebit tussen 0,25 ml en 0,40 ml ligt.

**Voorbereiding:**
Maak het behandeloppervlak grondig vrij van tandsteen. Voor een optimaal resultaat moet overaligke vloeiostif/speeksel van het te behandelen oppervlak worden verwijderd.

**Applicatie:**
Breng **ORBIS Fluoride Varnish** gelijkmatig aan, zodat het hele oppervlak met een dun laagje is bedekt. Verochtig het toeappingsgebied (met een lichte spoeling of door natuurlijke speekselproductie) om er zeker van te zijn dat **ORBIS Fluoride Varnish** uithardt.

**Aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen:**

Patiënten moeten worden geïnstrueerd dat zij de eerste 4 uur na de behandeling vaste voeding, alcohol, tanden poetsen en het gebruik van tandzijde moeten vermijden.

Colofonium kan de polymerisatie en hechting van composieten verminderen. In overeenstemming met het beoogde gebruik vormt **ORBIS Fluoride Varnish** een kleverige massa. Bij gebruik van de tube kan de deksel vastkleven door materiaalresten op het schroefdraad. Veeg eventuele verontreinigingen af met een ethanolhoudende doek.

In zeldzame gevallen zijn oedemateuze zwellingen, in het bijzonder na toepassing op gevulde oppervlakken, gerapporteerd.

Bij vergelijkbare preparaten is zeer zelden ademnood bij kinderen met astma gerapporteerd.

Bij patiënten met een gevoelig spijsverteringssysteem kan na een uitgebreide behandeling misselijkheid optreden.

Bij overgevoeligheid: Verwijder de lak met een zachte tandenborstel en tandzijde en spoel daarna met warm water.

Voer op de dag van de behandeling geen verdere bewerkingen met fluoridehoudende preparaten uit.

Schort de inname van fluoridetabletten na een behandeling met **ORBIS Fluoride Varnish** enkele dagen op.
Slik de lak niet in.

Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de verplichting om door ons geleverde preparaten te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing.

**Opslag:**
Opslaan tussen 4°C-23°C. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.
**Afvoer:**
Afvoer van het hulpmiddel volgens de lokale officiële voorschriften.

**Meldingsplicht:**
Ernstige incidenten zoals overlijden, tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere personen en een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, die in samenhang met **ORBIS Fluoride Varnish** zijn optreden of hadden kunnen optreden, moeten aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten worden gemeld.

## PL Instrukcja użycia | MD UE Wyrób medyczny Lakier fluorkowy do znoszenia nadwrażliwości zębów

**Opis produktu:**
**ORBIS Fluoride Varnish** to lakier fluorkowy do znoszenia nadwrażliwości zębów, przeznaczony do stosowania na powierzchni szkliwa i zębiny. **ORBIS Fluoride Varnish** przwiera nawet do wilgotnych powierzchni, a obecność resztkowej wilgoci oraz sliny nie wpływa na jego działanie.

**ORBIS Fluoride Varnish** jest etanolową zawiesiną kalafonii z dodatkim sztucznego aromatu oraz substancji słodzącej w postaci ksylitolu.
1 ml zawiesiny **ORBIS Fluoride Varnish** zawiera 50 mg fluorku sodu, co odpowiada 22,6 mg fluoru.

**Wskazania:**
**ORBIS Fluoride Varnish** jest przeznaczony do:
leczenia nadwrażliwości zębów
leczenia nadwrażliwych powierzchni korzeni zębów

**Przeciwwskazania:**
**ORBIS Fluoride Varnish** zawiera kalafonię i sztuczny aromat. W przypadku rozpoznanej nadwrażliwości (alergii) na składniki produktu **ORBIS Fluoride Varnish** należy zrezygnować z jego zastosowania.

Produktu **ORBIS Fluoride Varnish** nie należy stosować u pacjentów z wrodzającymi zmianami zapalnymi dziąseł i błony sluzowej jamy ustnej.

**ORBIS Fluoride Varnish** nie jest przeznaczony do systematycznego stosowania.

**Grupa docelowa pacjentów:**

**ORBIS Fluoride Varnish** może być stosowany bez ograniczeń u wszystkich pacjentów, niezależnie od ich wieku i płci.

**Właściwości produktu:**
Właściwości produktu odpowiadają wymogom wynikającym z jego przeznaczenia oraz obowiązujących norm produktowych.

**Użytkownik:**
Produkt **ORBIS Fluoride Varnish** jest przeznaczony do stosowania przez użytkownika profesjonalnego posiadającego wykształcenie stomatologiczne.

**Zastosowanie:**
Zalecane dawkowanie
acjenci z uzębieniem mlecznym ok. 0,25 ml produktu **ORBIS Fluoride Varnish**
Pacjenci z uzębieniem mieszanym lub stałym ok. 0,40 ml produktu **ORBIS Fluoride Varnish**

Na twarde tkanki zęba nanieść cienką warstwę produktu **ORBIS Fluoride Varnish**. Grubsza warstwa produktu łatwo się łuszczy i nie zapewnia lepszego efektu terapeutycznego. Doświadczalnie ustalono, iż ilość potrzebna do pokrycia pełnego uzębienia wynosi między 0,25 ml a 0,40 ml.

**Przygotowanie:**
Leczoną powierzchnię dokładnie oczyścić z kamienia nazębnego. Najlepsze wyniki zapewnia całkowite usunięcie nadmiaru wilgoci/sliny z leczonych powierzchni.

**Aplikacja:**
Równomiernie rozprowadzić **ORBIS Fluoride Varnish**, pokrywając całą powierzchńnię cienką warstwą produktu. Aby zapewnić prawidłowe związanie produktu **ORBIS Fluoride Varnish**, zwlzyźć leczoną powierzchnię (poprzez delikatne płukanie lub umocwienie naturalnego przepływu śliny).

**Informacje dodatkowe, środki ostrożności:**
Należy poinformować pacjenta, iż w czasie 4 godzin od zabiegu nie powinien spożywać pokarmów stałych, alkoholu, szczotkować zębów oraz używać nici dentystycznej.

Kalafonia może wpływać na przebieg polimerizacji oraz wiązanie kompozytów. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem, produkt **ORBIS Fluoride Varnish** posiada lepłą konsystencję. Podczas stosowania produktu w tubce, resztki materiału pozostające na gwincie mogą powodować przyklejenie się nakrętki. W razie potrzeby usunąć zanieczyszczenia za pomocą ściereczki zwilżonej etanolem.

Po zastosowaniu produktu w rzadkich przypadkach obserwowano obrzęki, szczególnie po aplikacji na większej powierzchni.

U dzieci z astmą bardzo rzadko obserwowano duszności po zastosowaniu podobnych preparatów.

U pacjentów z wrażliwym układem pokarmowym mogą wystąpić nudności po pokryciu produktem dużej powierzchni.

W razie wystąpienia objawów nadwrażliwości: usunąć lakier za pomocą miękkiej szczoteczki do zębów oraz nici dentystycznej, a następnie sptukać ciepłą wodą.
W dniu zabiegu nie stosować innych preparatów zawierających związki fluoru. Po leczeniu za pomocą produktu **ORBIS Fluoride Varnish** należy na kilka dni odstawić leki zawierające związki fluoru.

Nie polykać lakieru.

Udzielane przez nas informacje i/lub porady nie zwalniają Państwa z obowiązku sprawdzenia przydatności dostarczonych przez nas preparatów do zamierzonych zastosowań.

**Przechowywanie:**
Przechowywać w temperaturze 4°C-23°C. Nie stosować po upływie terminu ważności.
**Utylizacja:**
Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

Bij patiënten met een gevoelig spijsverteringssysteem kan na een uitgebreide behandeling misselijkheid optreden.
Bij overgevoeligheid: Verwijder de lak met een zachte tandenborstel en tandzijde en spoel daarna met warm water.
Voer op de dag van de behandeling geen verdere bewerkingen met fluoridehoudende preparaten uit.

Schort de inname van fluoridetabletten na een behandeling met **ORBIS Fluoride Varnish** enkele dagen op.
Slik de lak niet in.

Onze aanwijzingen en/of adviezen ontslaan u niet van de verplichting om door ons geleverde preparaten te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing.

## LT Naudojimo instrukcija | MD ES Medicinos priemonė Lakas dantų jautrumui sumažinti, kurio sudėtyje yra fluorida

**Produkto aprašymas:**

**ORBIS Fluoride Varnish** yra fluorida turintis dantų lakas, skirtas paviršiniam naudojimui ant emalio ir dentino. **ORBIS Fluoride Varnish** prikimba ir prie drėgnų paviršių ir toleruoja drėgmės ir seilių likučius.

**ORBIS Fluoride Varnish** yra kanifolijos etanolio suspensija su dirbtiniais kvapais ir saldžiu ksilitolio poveikiu.

1 ml **ORBIS Fluoride Varnish** sudėtyje yra 50 mg natrio fluorida, atitinkančio 22,6 mg fluorida.

**Indikacijos:**
**ORBIS Fluoride Varnish** skirtas naudoti:
jautriems dantims gydyti
jautrių šaknų paviršių gydymas

**Kontraindikacijos:**
**ORBIS Fluoride Varnish** sudėtyje yra kanifolijos ir dirbtinių kvapų. **ORBIS Fluoride Varnish** neturėtų būti naudojamas esant žinomam padidėjusiam jautrumui (alergijai) sudėtinėms dalims.

**ORBIS Fluoride Varnish** kontraindikotinas pacientams, sergantiems opiniu gingivitu ar stomatitu.

**ORBIS Fluoride Varnish** neskirtas sisteminiam gydymui.

**Tikslinė pacientų grupė:**
**ORBIS Fluoride Varnish** gali būti naudojamas visiems pacientams be apribojimų neatsižvelgiant į jų amžių ar lytį.

**Preparato savybės:**
Priemonės veiksmingumo charakteristikos atitinka pashirties ir atitinkamų priemonės standartų reikalavimus.

**Naudotojas:**
**ORBIS Fluoride Varnish** skirta naudoti profesionaliems odontologams.

**Naudojimas:**
Rekomenduojama dozė:

Pacientams, turintiems pieningių dantų šakandį – maždaug 0,25 ml **ORBIS Fluoride Varnish**

Pacientams, turintiems mišrų arba nuolatinį dantų šakandį – maždaug 0,40 ml **ORBIS Fluoride Varnish**

**ORBIS Fluoride Varnish** tepamas plonu sluoksniu ant dantų kietųjų audinių. Storas sluoksnis lengviau nusluopa nuo danties ir terapiją privalmuo nesuteikia. Visam dantui laikui paprastai sunaudojama nuo 0,25 ml iki 0,40 ml priemonės.

**Preparavimas:**
Nuo gydymoju paviršių kruopščiai nuvalykite dantų akmenis. Siekdami optimalaus rezultato nuo gydymoju paviršių pašalinkite drėgmės ir (arba) seilių perteklių.

**Aplikacija:**
**ORBIS Fluoride Varnish** tepkite tolygiai padengdami visą paviršių plonu sluoksniu. Siekdami užtikrinti **ORBIS Fluoride Varnish** sukietėjimą, sudrėkinkite naudojuom sritį (lyngvai paplaudami arba leisdami natūraliai susidaryti seilėms).

**Pastabos, atsargumo priemonės:**
Įspėkite pacientą 4 valandas po gydymo vengti kieta maisto, alkoholio, nevalyti dantų bei nenaudoti dantų siūlo.

Kanifolija gali inhiбуuoti kompoziti polimerizaciją ir adheziją.

Pagal savo veikimo pobūdį **ORBIS Fluoride Varnish** yra lipnios konsistencijos. Naudojant tubelę dėl ant sriegio esančių medžiagos likučių dangtelis gali prilipti. Pirirekus, nuvalykite nešvarumus skudurėliu, suvilgytu etanoliu.

Kartais stebimas edeminis patinimas, ypač kai dengiami dideli paviršiai. Naudojant panašius preparatus astma sergantiems vaikams, labai retais atvejais būvo stebima dispneja.

Pacientus, kurių virškinimo sistema jautri, naudojant didelį kiekį medžiagos gali atsirasti pykinimas.

Esant padidėjusiam jautrumui: pašalinkite laką minkštu dantų šepetėliu ir dantų siūlu, pabaigoje nuplaukite šiltu vandeniu.

Aplikacijos dieną nenaudokite jokių kitų fluorida preparatų.

Kelias dienas po gydymo **ORBIS Fluorde Varnish** nevartokite fluorida tablečių. Lako nenurykite.

Mūsų informacija ir/arba patarimai neatleidžia jųsų nuo pareigos patikrinti ar mūsų tiekiami produktai yra tinkami naudoti jūsų pasirinktiems tikslams.

**Laikymas:**
Laikykite 4–23 °C temperatūroje. Nenaudokite galiojimo laikui pasibaigus.

**Šalinimas:**
Šalinkite produktą laikydamiis vietas institucijų reikalavimui.

**Prievalės pranešti:**

Apie sunkių padarinių sukėlusius incidentus, pvz., paciento, naudojoja ar kito asmens mirtį, laikiną arba nuolatinį sunkų sveikatos būklės pablogėjimą ir didelį pavojų visuomenės sveikatai, kurie įvyko arba būtų galėję įvykti naudojant **ORBIS Fluoride Varnish**, būtina pranešti gamintojas ir atsakingai institucijai.

## ET Kasutusjuhised | MD EL Meditsiiniseade Fluoriidi sisaldav lakk hammaste tundlikkuse vähendamiseks

**Toote kirjeldus:**
**ORBIS Fluoride Varnish** on fluoriidi sisaldav lakk hammaste tundlikkuse vähendamiseks hambamaaili- ja dentiinipindade ravi käigus. **ORBIS Fluoride Varnish** kinnitub ka nisketele pindadele ja talub niiskuse ja sülje jääke. **ORBIS Fluoride Varnish** on etanooliga suspensioon kunstliku lõhnaga kampolist ja magusat maitselt andvast ksülitoolist.
1 ml toodet **ORBIS Fluoride Varnish** sisaldab 50 mg naatriumfluoridi 22,6 mg fluoriidi kohta.

**Näidustused:**
**ORBIS Fluoride Varnish** on mõeldud:
ülilindlike hammaste raviks
tundlike juure pealispindade ravi
Vastunäidustused:
**ORBIS Fluoride Varnish** sisaldab kampolist ja kunstlikku lõhnainet. Toodet ei tohi kasutada, kui on teada ülilindlikeks (allergia) toote **ORBIS Fluoride Varnish** koostisosade suhtes.
Toodet **ORBIS Fluoride Varnish** ei tohi kasutada patsientidel, kelle igemetel või suu limaskestal esineb haavandiilist põletikku.

Toode **ORBIS Fluoride Varnish** ei ole mõeldud süsteemseks raviks.

**Patsientide sihtrühm:**
**ORBIS Fluoride Varnish** sobib kasutamiseks kõikidel patsientidel sõltumata nende vanusest või soost.

**Toote toimumisnäitajad:**
Toote toimumisnäitajad vastavad esmämrgipärase kasutamise nõuetele ja asjakohastele tootenormidele.

**Kasutaja:**
Toodet **ORBIS Fluoride Varnish** tohib kasutada hambaravis väljaõppe saanud professionaalne kasutaja.

**Kasutamine:**
Soovitulisks doos:

Piihamammastega patsientidel kasutada u 0,25 ml toodet **ORBIS Fluoride Varnish**
Osaliselt piihamammastega või jäävhammastega patsientidel kasutada u 0,40 ml toodet **ORBIS Fluoride Varnish**

Kandke õhuke kiht toodet **ORBIS Fluoride Varnish** hambale. Paks kiht tuleb kergelt maha ja ei anna ravieelseid.Kogemustele tuginedes jääb kõigi hammaste katmiseks vajalik kogus vahemikku 0,25 ml ja 0,40 ml.

**Ettevalmistamine:**
Eemaldage töödeldavalt pinnalt põhjalikult hambakivi. Optimaalse tulemuse saavutamiseks tuleb ülelaigne vedelik/sülj töödeldavalt pinnalt eemaldada.

**Apiltseerimine:**
Kandke **ORBIS Fluoride Varnish** ühtlaselt peale nii, et kogu pealispind oleks kaetud õhukese lakikihiga. Niisutage kasutuspinda (kas kerge loputuse või loomulikul teel tekkiva sülje abil), tagamaks laki **ORBIS Fluoride Varnish** kinnitumise hambapinnale.

**Hoiausued, ettevatusabinõud:**
Patsiente tuleb teavitada sellest, et 4 tundi pärast pealekandmist peab vältima tahke toidu ja alkoholi tarbimist, hammaste puhastamist ning hambaniidi kasutamist.

Kampol võib mõjutada polimerisatsiooni ja komposiitmaterjalide kinnitumist. Kasutusotstarbe tõttu on laki **ORBIS Fluoride Varnish** konsistents kleepuv. Toru kasutamisel võivad keermestikul olevad materjaliäägid kaane kinni kleepida. Vajaduse korral eemaldage mustus etanooli sisaldava lapiga.

Harvadel juhtudel on teatatud tursete ilmemisest, eriti just pärast suurteil pindadel kasutamist.

Sarnaste preparaatide puhul teavitati väga harva hingamispuudulikkusest astmaatiliste laste puhul.

Tundliku seedesüsteemiga patsientidel võib suuremahulise kasutamise puhul esineda liiveldust.

Ületundlikkuse korral: Eemaldage lakk pehme hambaharja ja hambaniidiga, loputage viimaks sooja veega.

Ravipäeval ei tohi läbi viia edasisi protseduuri fluoriidi sisaldavate preparaatidega.

Fluoriiditabletteid võtmine tuleks pärast ravi lakiga **ORBIS Fluoride Varnish** mõneks päevaks katkestada.